



Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Medizinproduktes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Fachberater/innen in Ihrem Reformhaus.

Anwendungsgebiete

Wann wird silicea Magen-Darm DIRECT angewandt?

Zur Linderung bei akuten Magen-Darm-Beschwerden verbunden mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall unterstützt silicea Magen-Darm DIRECT die Bindung von Krankheitserregern. Empfohlen zur Langzeitanwendung von bis zu 6 Wochen bei Personen mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Wann, wie oft und wie lange sollten Sie silicea Magen-Darm DIRECT anwenden?

Bei akuten Beschwerden nehmen Kinder und Erwachsene 3- bis 5-mal täglich 2 Portionssticks à 15 ml direkt ein. Der Stick kann auch in Wasser oder Tee eingerührt werden. Die Einnahme sollte zwischen den Mahlzeiten und ggf. direkt vor dem Schlafengehen erfolgen.

Die Anwendung kann nach Abklingen der akuten Beschwerden mit einer Dosierung von 3 x täglich 1 Portionsstick à 15 ml noch einige Tage fortgesetzt werden. Bei starken Schmerzen, hohem Fieber oder falls die Behandlung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein sollte, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Bei chronischen Beschwerden nehmen Erwachsene 3 x täglich 1 Portionsstick à 15 ml direkt oder in Wasser oder Tee nüchtern oder zwischen den Mahlzeiten ein. Bei chronischen Beschwerden empfehlen wir eine Behandlung von bis zu 6 Wochen, wobei sich eine Besserung der Symptome bereits nach einer 3-wöchigen Behandlung zeigen kann. silicea Magen-Darm DIRECT ist ein rein mineralisches und gut verträgliches Medizinprodukt.

Bitte beachten

Bei einer Durchfallerkrankung ist es wichtig, den auftretenden Flüssigkeitsverlust zusätzlich durch ausreichendes Trinken auszugleichen. Insbesondere bei Kindern ist ein sofortiger Flüssigkeitsgleichgewicht unbedingt notwendig.



Hinweis zur Anwendung

Vor Gebrauch den Portionsstick durchkneten. silicea Magen-Darm DIRECT soll für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wechselwirkungen

Was müssen Sie beachten, wenn Sie neben silicea Magen-Darm DIRECT noch Arzneimittel einnehmen?

Bitte nehmen Sie in Absprache mit Ihrem Arzt regelmäßig einzunehmende Arzneimittel zeitlich versetzt ein, da sonst auf Grund der Wirkweise von silicea Magen-Darm DIRECT die Arzneimittelwirkung beeinflusst werden kann. Bei längerer Anwendung sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit und eine ausgeglichene vitaminreiche Kost geachtet werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie silicea Magen-Darm DIRECT nicht anwenden?

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes







silicea Magen-Darm DIRECT darf nur bis zu dem auf dem Portionsstick und der Faltschachtel mit „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Bewahren Sie silicea Magen-Darm-DIRECT bitte nicht über 25°C auf und schützen Sie es vor Frost. silicea Magen-Darm DIRECT soll für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Darreichungsformen und Inhalt: 30 Portionssticks à 15 ml Gel = **450 ml**

Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil: 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 3,5 g Siliciumdioxid

Bedeutung der Symbole auf Packung und Stick

- | | |
|--|---|
|  : Hersteller |  : Chargenbezeichnung |
|  : Temperaturbegrenzung |  : Bitte Gebrauchsanweisung beachten |
|  : Verwendbar bis |  : Zertifiziertes Medizinprodukt |

Stand der Information: März 2014

 ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG • 79236 Ehrenkirchen

CE 0297

Wissenswertes zu Magen-Darm-Erkrankungen

Ein gesunder Magen-Darm-Trakt ist wesentlich für unser Wohlbefinden

Magen und Darm gehören zu den wichtigsten Organen unseres Körpers und stellen ein vielfältiges Verdauungssystem dar, dessen harmonisch aufeinander abgestimmter Ablauf wesentlich für unser körperliches Wohlbefinden ist. Wenn dieser Ablauf gestört ist, kann unser Verdauungssystem seine wichtigen Aufgaben nicht mehr vollständig erfüllen. Dies ist dann z. B. in Form von Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall spürbar.

Ursachen

Die Ursachen für Magen-Darm-Erkrankungen sind häufig in den Magen-Darm-Trakt gelangte Krankheitserreger und deren Giftstoffe. Dies kann z. B. durch den Verzehr von verdorbenen Lebensmitteln und Getränken geschehen.

Folgen

Die massive Belagerung des Magen-Darm-Traktes durch Krankheitserreger und deren Giftstoffe kann zu Magen-Darm-Erkrankungen wie Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall führen.

Bindung


Krankheitserreger und deren Giftstoffe werden durch silicea Magen-Darm DIRECT auf rein physikalische Weise gebunden und auf natürlichem Weg über den Darm ausgeschieden.

Der wirksame Bestandteil von silicea Magen-Darm DIRECT ist feinstverteiltes (kolloidales) Kieselsäure-Gel, eine Verbindung des Mineralstoffes Silicium mit Sauerstoff und Wasser.

Das Besondere an Kieselsäure-Gel ist seine außergewöhnlich große Bindungsfähigkeit für Krankheitserreger und deren Giftstoffe. So werden Krankheitserreger und deren Giftstoffe im Magen-Darm-Trakt auf rein physikalische Weise gebunden und auf natürlichem Weg über den Darm ausgeschieden. Die Symptome können gelindert, die Regeneration des gestörten Magen-Darm-Traktes unterstützt werden.

Da Kieselsäure-Gel neben den Krankheitserregern auch Gase bindet, kann es auch lästige Blähungen reduzieren.

**silicea Magen-Darm DIRECT mit rein mineralischer Kieselsäure.
Auch für Kinder geeignet.**



hübner
gesundheit leben

Ein Produkt der HÜBNER-Gruppe

ANTON HÜBNER GmbH & Co. KG - Verbraucherservice - 79236 Ehrenkirchen

Telefon 07633 / 909-0 • info@huebner-vital.de • www.huebner-vital.de